



Ce portfolio traite les amphibiens, ophidiens, lézards, araignées, qui ont été observés sur le site de l'association Panakuh, ce site abrite une grande biodiversité, les planches sont organisées par famille, genre puis espèce. Les identifications des espèces sont basés sur l'examen d'un naturaliste et les clés d'identifications (reptiles, ophidiens, amphibiens, lézard, de Guyane). Merci à Vincent PREMEL d'avoir examiné ce portfolio et avoir identifié les espèces d'amphibiens par chant.


INVENTORIONS LA BIODIVERSITE DU CENTRE PANAKUH DES SAVOIRS DE LA FORÊT

Centre PANAKUH des Savoirs de la Forêt (CPSF) lieudit "pont crique Gabaret", RN2 – Saint-Georges de l'Oyapock Guyane 97313/France

panakuh.association@yahoo.fr / 0694128015

v.premel@yahoo.fr / 0682580608

OPOYA Patricia BTSA GPN / patriciaopoya31@gmail.com / 0694462450



Les Allobates familles des Aromobatidae



AALLOBATE FEMORALE -
allobates femoralis



Petite espèce commun de la litière forestière,
chant typique cimi..cimi..cimi.. Souvent entendu
en forêt.

Flanc noirs séparées du dos brun par une ligne
claire, ventre noir tacheté de blanc, lèvres
blanche,



AANOMALOGLOSSE DES GUYANES -
anomaloglossus baeobatrachus



Petite espèce de la litière forestière.

Coloration générale brune avec une fine
diagonale blanche ou bleutées s'étendant à
l'œil a laine.

Ventre blanc cassé a jaune.

Les **Crapauds** familles des *Bufo*nidae**CRAPAUD FEUILLE** – *Rhinella castaneotica*

Espèce de la litière forestière terrestre.
Crêtes distinctes peu développée, museau long et pointu, Iris verdâtre, différentes variétés de couleurs selon l'âge de l'individu

**CRAPAUD DE LESCURE** – *Rhinella lescurei*

Iris doré, crêtes indistinctes, museau pointu, lèvre blanche, ventre tacheté de blancs à roux rougeâtre



Juvénile

CRAPAUD AGUA/BŒUF – *Rhinella marina*

Crapaud Agua/Bœuf, grand crapaud avec des glandes parotoïde très développées et un museau caréné.

Coloration beige uni (mâle) ou avec des muscles noirs ou rousses (juvénile et femelle)

Omniprésent dans les paysages anthropisés, savane inondée, jardins, prairie et bord de route, vit dans les terriers terrestres, parfois en communauté ou seule.

Massif les femelles peuvent atteindre jusqu'à 25 cm

**Crapaud perlé – *Rhinella margaritifera***

Espèce de la litière forestière.

Crête bien marquées, museau tronqué, iris jeune doré.



Femelle, de face et de dos



Type juvénile

Amazophrynella des Tékos –
Amazophrynella teko

Espèce minuscule, museau pointue,
points blancs présent partout sur le
corps, paume et palme rouge, gorge
noire ; ventre blanc/jaune tacheté
(mâle 15 mm, femelle 20,6 mm)

Crapaud tacheté – *Rhaebo guttatus*


Grand jusqu'à 14 cm.

Dos beige à marron.

Flancs bordeaux.

Ventre maculé de jaune.

Juvénile : dos gris, flanc noir, ne pas confondre
avec les bébés de *Rhinella marina*

Les **Leptodactyles** familles des *Leptodactilydae*

Mâle

Adénomère familière – *Adenomera andreae*

Espèce omniprésente en forêt et dans les jardins et en périphérie des zones humides.

Grande diversité de colorations et de motifs, souvent avec une fine ligne rougeâtre, bourrelet peu marqué

Adénomère des herbres -
Adenomera hylaedactyla

Présent dans les jardins, friches, savanes, bord de route. Ventre et cuisse gris, bourrelet marqué, tâches noires sur le flanc

Très rapide, chant typique pit pit pit.



LEPTODACTYLE DE PETERS – *Leptodactylus petersii*

Espèce des bas-fond marécageux forestier, teinte générale gris/verdâtre, ventre blanc cassé, cuisse grisâtre, chant "puit..puit..puit.."



LEPTODACTYLE DE KNUDSEN – *Leptodactylus Knudseni*

Grande espèce forestier, pli dorsolatéral court. Chant Wrrrrrououp très puissant, flancs orange à rouge chez l'adulte, bourrelet s'étend de l'œil à la moitié du dos, bande qui ne dépasse pas l'épaule (massif jusqu'à 17 cm)

Les rainettes familles des *Hylidae*

OSTEOCEPHALE TAURIN
- *Osteocephalus taurinus*

Espèce des mares forestiers temporaire et des bas fond, iris jaune rayonné typique, grand jusqu'à 10cm, crêtes marquées sur le museau



SCINAX VARIABLE -
Scinax x-signatus

Macule allongée sur le dos.
Généralement une deux paires de taches en forme de boomerang en vue dorsale, ces taches formes un))
Commun dans les maisons et jardins
En période de reproduction les mâles ont une teinte jaune à verdâtre



SCINAX DE JOLIE -
Scinax jolyi

Grand triangle gris/beige tracé par une bande brune horizontale, présence de tubercule saillants sous la mandibule, espèce arboricole (quasi menacée)

Ces espèces ont été identifiées grâce à l'expertise d'un naturaliste Vincent PREMEL, qui a reconnue par chant de nuit ces rainettes (les photos ont été prise depuis internet, d'un réseau :



TRACHYCEPHALE KUNAWALU –
Trachycephalus resinificrtix

Grand espèce arboricole, massif jusqu'à 10 cm, vit dans les canopée, chant puissant "ouin...ouan..ouin.." iris en frome de "+", macule blanc sur fond brun noir, avec des petite tâche blanc sur la partie brun noir, contrairement à *Trachycephalus hadroceps*



OSTEOCEPHALE OOPHAGE –
Osteocephalus oophagus

Iris rayonné typique, museau granuleux retroussé, aines peu différentes du corps



TRACHYCEPHALE METRONOME –
Trachycephalus hadroceps

Vit dans les canopée, chant nocturne puissant "toc..toc..toc..", iris en frome de "T", corps granuleux, macule blanc en frome de "T"



Rainette patte d'oie -
Boana boans

Très grand rainette forestier, massif jusqu'à 12 cm, mains et pieds très palmés, chant puissant, grave "boa..boa" lancé depuis les arbres en bord de crique pendant les saisons sèches, intérieur iris en forme de



Rainette à bandeau -
Dendropsophus leucophyllatus

Espère nocturne des mares forestières et des marais, peu commun.

Super motif dorsal, macule jaune (coloration nuit) à blanc (coloration jour) sur fond brun à rouge, ventre rose.



Rainette éperonnée -
Boana calcarata


Espèce forestière des rives et des bas-fond marécageux, long éperon sur les talons, flancs et intérieur des cuisses gris-bleuté, zébré de noir.

Rainette ponctué – *Boana punctata*COLORATION
JOUR

COLORATION NUIT

Espèce nocturne des zones humide, parfois dans les fossés des jardins.

Teinte verte le jour à orange la nuit, présence dorsolatérale linge rouge et jaune s'étendant l'œil à laine

SCINAX DES MAISONS –
Scinax ruber

Mâle

Très présent dans les maisons et jardins, galope sur les murs et tables à la nuit tombé. Les mâles sont jaunes en période de reproduction.

Bande dorsolatérale sombre, intérieur des cuisse jaune et noire.

Chant *praa...* aiguë et rauque



Les Hylodes familles des *Strabomantidae*



HYLODE PORTE-X – *Pristimantis chiastonotus*

Espèce diurne et terrestre, porte un "X" dessiné sur le dos, museau allongé, partie latérale de la tête sombre (masque sombre)



HYLODE DE JOHNSTONE –
Eleutherodactylus johnstonei

Espèce invasive des zones anthropisées et sur le littoral, tâche sombre entre les yeux en forme de triangle, bande sombre sur la partie latérale s'étendant l'œil jusqu'à l'épaule, cuisse verdâtre à l'aîne, iris rougeâtre sur le côté.


Les Reptiles

BOA D'AMAZONIE – *Coralus hortulana*




DISPAS A NUQUE ROUSSE – *Dispas catesbyi*



LIANE PERROQUET – *Leptophis ahaetulla***ATRACTUS FAUX - CORAIL – *Atractus badius***

CHASSEUR SOUFRE – *Pseustes sulphureus*



GRAGE CARREAUX – *Botrophs atrox*



Couresse à points crème – *Taeniophallus nicagus*



Les lézards



Anolis à fanon bleu – *Norops chrysolepis*

Famille des ***Dactyloidae***, ligne sombre tracé entre les yeux, museau court,



TROPIDURE SOURCILLEUX – *Uranoscodon superciliosus*

Famille des ***Tropiduridae***, tête triangulaire, présent dans les zone humide (forêt inonder)



TROPIDURE PLISSE – *Plica plica*

Famille des ***Tropiduridae***, tête toujours à l'envers, présence tache noir (collier noir) sur le coup.



CHALCIDE FOUISSEUR – *Bachia flavescens*

Familles des **Gymnophthalmidae**,
terrestre, pattes atrophiées
(minuscules) à l'avant et à l'arrière,
corps long



AMEIVE COMMUN - *Ameiva ameiva*

Famille des **teiidæ**, espèce très
commun, jardin, forêt primaire et
secondaire

Coloration verte selon l'âge de
l'individu



Lézard coureur indéterminé -
Cnemidophorus lemniscatus (type
femelle)

Famille des **teiidæ**, pleins de bandes
blanches sur le dos, points blancs
présent sur les cuisses, ventre
intérieure vert

Anolis brun doré – *Norops fuscoauratus*

Famille des Dactyloidae, museau long, bande sombre peu marqué entre les yeux, présence d'une tache noire derrière la tête sur la nuque.

Iguane vert – *Iguana iguana*

Arthrosaure de Kock – *Arthrosaura kockii*

Famille des Gymnophthalmidae, bande dorsale qui part du museau (orange)

Les Araignées

Phrynos goesii Thorell




Pseudoclamoris gigas

Mygalomorphe de la famille des theraphosidae.

Grand espèce arboricole et nocturne, possible de l'observer à la tombée de la nuit à quelque mètre du sol, coloration roux fauve à orange/rose, bandes noires en rayons sur le céphalothorax.

Inoffensif, cependant manipuler ne permet pas de déterminer une espèce !



MYGALE SQUELETTE – *Ephebopus Murinus*

Mygalomorphe de la famille des theraphosidae

Espèce terrestre et nocturne, vit dans les terriers souterraine, possible de le voir devant son terrier la nuit lorsqu'il chasse, présence de bandes blanches sur chacun de ses pattes, coloration noire à roux fauve.

Micrathena schreibersi - Aranémorphe de la famille des **Araneidae** et de la sous famille des **Gasteracanthinae**

Abdomen jaune et noir, présence de deux pointes noires à rouge vif, deux points sur la partie latérale de l'abdomen, est une espèce forestière tissant des toiles orbiculaires.



Araignée banane – *Phoneutria fera*

Aranéophonore de la famille des Ctenidae, bandes noires sur chaque pédipalpe, taches claires sur l'abdomen rangé, espèce endémique de l'Amérique du Sud, cette araignée a le venin le plus actifs sur les humains, en cas de morsure signalé sont rarissime.